



MULATO II

Fomu ya Taarifa ya MULATO II® (Brachiaria hybrid CV Mulato II)

MULATO II® inahitaji udongo wenye uvujaji mzuri wa maji na wenye rutuba ya wastani hadi ya juu. Kiwango kilichopendekezwa cha mbegu ni kilo 6-8 za MULATO II® kwa kutumia mashine ya kupanda mbegu, ukipima mbegu 15 hadi 20 kwa mita moja kwa mstari na umbali wa sentimita 35 hadi 40 kati ya mistari. Unaweza pia kupanda kwa kunyunyiza mbegu ukitumia mashine au kwa mikono ukihakikisha kiwango cha mbegu inatumika kwa hekta ni kati ya kilo 8 hadi 10 za mbegu zilizo na koti.

Tunapendekeza kuzibia mbegu dawa ya kuua wadudu (uliza kwanza kwa mtaalamu wa eneo lako kwa maelekezo sahihi) ili kupunguza uharibifu unaosababishwa na sisimizi au ndege.

Kwanza tayarisha shamba kwa kulima ukitumia plau ama jembe. Kwa hatua ya pili tumia "harrow" kusaga mabonge ya udongo, kulainisha uso wa udongo, na kuandaa kitanda chema cha mbegu. Katika matayarishi haya kinachopaswa kuzingatiwa ni kina cha juu cha sentimita mbili. Usizidi kufanya kazi kwenye udongo kwa kina cha chini kwa sababu kitafanya udongo huru na kusababisha mbegu kuzamishwa zaidi na kuathiri kuibuka kwa miche.

Mvua au umwagiliaji unaweza pia kuzamisha mbegu zaidi ya 2 cm; hivyo, inashauriwa kutumia mojawapo ya mbinu zifuatazo kabla ya kupanda ili kupunguza hatari: kutumia roller, kupita tairi za trekta au tawi nzito la mti, au kutoa umwagiliaji mzito kusaidia kuimarisha ardhi ambapo mbegu zitapandwa.

Kama magugu yenye majani mapana yapo, unaweza kutumia dawa yoyote ya 2,4D kwa dozi ndogo baada ya siku 30 hadi 45 tangu miche ianze kuibuka.

Kwa ujumla, udongo wa kitropiki huwa na viwango vya chini vya nitrojeni na potasiamu;



PAPALOTLA
GRUPO

hivyo, mbolea zenye virutubishi hivi zitaboresha uanzishaji wa malisho na maendeleo ya mizizi. Ingawa inashauriwa kufanya uchambuzi wa udongo kabla ili kubainisha viambato vyao. Kwa kanuni wa jumla tumia kilo 100-80-00 NPK kwa hekta moja kwa mwaka

Malisho wa mifugo au uvunaji kwa mara ya kwanza kwa MULATO II® kunapaswa kufanywa siku 90 baada ya kung'aa. Mara tu ukianza kuota tena kwa hali nzuri ya hewa, chomeza kila baada ya siku 25 hadi 30. Hatua hii itahamasisha misimamo bora ya mimea. Ukweli au mzunguko wa kuchomeza utategemea hali za hewa za eneo husika.

Sifa kuu za MULATO II®	
Tamia ya ukuaji	Nusu-inayoinama
Mzunguko wa maisha	Mataifa ya kudumu
Uzalishaji	25-30 tani / ha / mwaka DM
Uwezo wa protini	12-18%
Uwezo wa mmeng'enyoy	55-66%
Matumizi	Kumaliza malisho, hayi na ukataji
Urefu	1.20-1.40 m
Uwiano wa majani dhidi ya shina	Juu
Uhimili wa spittlebug	Mvumilivu
Mtiririko wa maji ardhini	Inahitajika mtiririko mzuri wa maji
Kupanda mbegu	Kupandwa kwa mkondo au miche
Kina cha kupanda mbegu	Max 2 cm
Kiwango cha mbegu	8-10 kilo/hekta
Siku za kuanzishwa	Siku 90-120
Mwinuko wa mvua	Angalau mm 500 kwa mwaka
Mita juu ya usawa wa bahari	0-1,500 mita juu ya usawa wa bahari
Ukimilifu wa udongo	Kati
Joto la chini kwa mwaka	> 17 °C
pH	4.5-8
Kiwango cha alumini	Mvumilivu